

Энрофлоксацин + L-аргинин

Антибиотик
широкого спектра действия

Виметрил 100

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ. СТЕРИЛЬНО

Vimetryl 100

СОСТАВ (в 1 мл содержится):

Энрофлоксацин	100 мг
L-аргинин	200 мг
Пропиленгликоль	0,2 мл
Бензиловый спирт	0,01 мл
Дистиллированная вода	до 1 мл

Виметрил 100 представляет собой прозрачный желтый раствор. Стекланные флаконы объемом 100 мл. Стерильно.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: антибактериальный препарат широкого спектра действия.

Энрофлоксацин, действующее вещество Виметрил 100 - бактерицидный антибиотик третьего поколения фторхинолов. Он подавляет рост и развитие грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium perfringens*, *Bordetella bronchiseptica*, *Campylobacter spp.*, *Corinebacterium pyogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*, а также *Mycoplasma spp.*

Энрофлоксацин быстро всасывается из места инъекции и проникает в большинство органов и тканей организма. Максимальная концентрация энрофлоксацина в крови достигается через 0,5-1 час, терапевтическая концентрация сохраняется на протяжении 24 часов. Энрофлоксацин в организме частично подвергается биотрансформации, выводится преимущественно с мочой и желчью.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

КРС, козы и овцы: Виметрил 100 назначают при инфекциях респираторного и пищеварительного тракта, вызванных: *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Mycoplasma spp.* также при вирусных инфекциях.

Свиньи: инфекции респираторной и пищеварительной систем: пастереллез, микоплазмоз, колибактериоз, сальмонеллез и сложные заболевания такие как атрофический ринит, пневмония и синдром MMA (мастит, метрит, агалактия).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Внутримышечно, подкожно. Однократно. Перед применением тщательно встряхнуть.

КРС, МРС, свиньи: в дозе 7,5 мл на 100 кг живого веса (эквивалентно 7,5 мг энрофлоксацина на 1 кг живого веса). Препарат следует вводить в количестве не более 15 мл в одно место крупному рогатому скоту и не более 5 мл свиньям.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо - 14 дней, молоко – 72 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Противопоказания: не выявлено.

Особые указания: не превышать максимальную дозу для введения в одно место. При подкожном введении рекомендуется разбавлять Виметрил 100 физраствором. Перед применением Виметрила 100 убедиться, что животные получали достаточное количество питьевой воды. Не применять по истечении срока годности.

Взаимодействие с другими лекарствами и другие формы взаимодействия: антациды и молочные продукты, содержащие магний, кальций и алюминий не использовать в течение 2-х часов до или после применения Виметрила 100. Виметрил 100 может использоваться одновременно с доксициклином при лечении микоплазмы.

Побочные эффекты: со стороны ЦНС: беспокойство, припадок; ЖКТ: повышенный аппетит, диарея; мочеполовая система: кристаллурия; кожа: кожный зуд, повреждение покровов при использовании неразбавленного препарата.

Меры личной профилактики: при попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть струей проточной воды. При введении препарата себе обратиться за медицинской помощью и показать вкладыш врачу.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Срок годности - 3 года с даты производства, после вскрытия флакона - 28 дней (в холодильнике). Хранить продукт плотно закрытым, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 до +25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА: без рецепта ветеринарного врача.

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Номер регистрационного удостоверения:

РК-ВП-4-3809-19, выдано «Вимедим Корпорэйшн», Кан То Сити, Нин Ки Дистрикт, Эйприл 30 Авеню 7, Р. Вьетнам.

Производитель: «Вимедим Корпорэйшн»,

Кан То Сити, Нин Ки Дистрикт, Эйприл 30 Авеню 7, Республика Вьетнам.

Представитель/Импортёр: ООО «ТД «РостАгроВет»

143602, Россия, МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Ямская, 17Б

Тел./факс: (495) 363-45-30, www.rostagrovet.ru; E-mail: office@rostagrovet.ru