

Инструкция по применению «Х-Ноoves» для копытных ванн

Перед ванной с профилактическим раствором необходимо установить ванну с водой или ванну с раствором для предварительной очистки копыт. Рекомендуемое расстояние между ваннами (омывочной и профилактической) 2м. Эффективность профилактического раствора «Х-Ноoves» выше, когда обрабатываются чистые копыта, кроме того ванна с дезинфицирующим раствором загрязняется меньше.

Подготовка копытной ванны к работе:

1. Вымойте ванну, а также вымойте прилегающую к ней зону.
2. Для приготовления раствора понадобится 10 литров «Х-Ноoves», которые нужно разбавить в 200 л воды.
3. Добавьте препарат в обычную воду, размешайте – раствор готов.
ВНИМАНИЕ: ВОДУ НЕ НАГРЕВАТЬ, НЕ ДОБАВЛЯТЬ КИСЛОТУ!
4. Ванна должна быть расположена в месте, где проходит 100% поголовья. Высота раствора в ванной должна быть 13-15 см., что позволит полностью обработать и защитить заднюю стенку копытец и межкопытную щель.
5. Для достижения максимальной эффективности профилактических обработок заменяйте раствор в ванне после прохода 250 -300 животных (зависит от степени загрязнения раствора).
6. При смене раствора в ванне, удалите всю грязь! Заливайте дезинфицирующий раствор только в чистую ванну.

Мы рекомендуем для достижения наибольшего положительного результата следующую схему использования:

Лечение:

В течение трех - четырех месяцев с начала применения «Х-Ноoves» каждую из коров пропускают через 200-литровую ванну с 5% раствором (10 литров на 200 литровую ванну) 3 раза в неделю пн-ср-пт, (каждые 48 часов).

В течении месяца количество прогонов (обработок) должно составлять не менее 10-12 раз.

Профилактика:

В дальнейшем, с профилактической целью, исходя из состояния копыт животных, количество обработок можно снизить до 8 - 9 раз в месяц – два раза в неделю (пн-чт).

ВНИМАНИЕ!

НАШ ПРЕПАРАТ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО, ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО МИНИМУМ 10 ОБРАБОТОК !!!

Инструкция по применению «X-Hooves» распылением (ручная обработка)

Для приготовления раствора при обработке копыт распылением, необходимо 2 литр «X-Hooves» развести в 10 литрах обычной воды (10% раствор), перемешать – раствор готов.

НЕ НАГРЕВАТЬ, НЕ ДОБАВЛЯТЬ КИСЛОТУ!

Перед распылением очистить копыта, тщательно обработать со всех сторон (убедитесь, что межпальцевое пространство и задняя часть копыта надежно обработано раствором). Для достижения наилучшего результата обработку проводить 3 раза в неделю пн-ср-пт, но не реже чем 1 раз в 48-72 часа.

Для увеличения эффективности проводите удаление навоза в секциях в то время, когда коровы находятся на дойке, после обработки животные должны возвращаться в чистую, сухую секцию с минимальным количеством навоза. Секции можно обрабатывать 3% раствором «X-hooves» для очистки от патогенных микроорганизмов и плесени. Частота обработки может быть увеличена и зависит от количества коров с проблемами копыт, а также условий содержания животных в коровнике.

Нанесение повязок на поврежденное копыто животного:

Для приготовления раствора при обработке копыт распылением, необходимо 1 литр «X-Hooves» развести в 5 литрах обычной воды (20% раствор), перемешать – раствор готов.

НЕ НАГРЕВАТЬ, НЕ ДОБАВЛЯТЬ КИСЛОТУ!

Перед нанесение повязки **тщательно** очистить поврежденное копыто от грязи и инородных тел. Тщательно обработать распылением со всех сторон (убедитесь, что межпальцевое пространство и задняя часть копыта надежно обработано раствором).

Повязку смочить в 20% растворе X-Hooves (**не отжимать**) и нанести на копыто.

Замена повязки не реже одного раза в 48-72 часа.

Животное с повязкой может ходить с общей группой через ванны с раствором «X-Hooves».

Открытые механические повреждения (раны) на теле животного обрабатывать опрыскиванием или смоченным в 20% растворе «X-Hooves» тампоном.

Для достижения наилучшего результата перед каждой обработкой распылением или нанесение повязок необходимо приготавливать свежий раствор.